

Augmenta el nombre d'aus que deixen abandonades a l'estany de Banyoles

En l'últim cens hivernal d'espècies aquàtiques es detecta que cada cop hi ha més ànecs domèstics, alimentats en part per gent que els dona menjar



Tres aus d'origen domèstic a la vora de l'estanyol del Vilar, en una foto d'arxiu. Foto: LIMNOS.

El control d'aus aquàtiques que cada any per aquestes dates es fa a l'estany de Banyoles aquest cop ha donat en general resultats satisfactoris, però l'entitat naturalista Limnos –coordinadora del cens– alerta que han detectat un increment del nombre d'aus provinents de cases particulars abandonades pels seus amos. En concret, aquest cop han comptat 21 ànecs domèstics o híbrids, que se sumen als que ja hi havia i que s'encreuen amb els salvatges, generant d'aquesta manera –diuen els naturalistes– un empobriment de l'espècie.

La facilitat amb què s'adapten a l'estany i al seu entorn es deu, en part, al fet que cada vegada hi ha més gent que els dona menjar. Com que això pot provocar que apareguin rates i que es contamini l'aigua, Limnos ha demanat al Consorci de l'Estany i a l'Ajuntament de Banyoles que emprenguin accions per evitar-ho.

Diversitat Al marge d'aquesta problemàtica, el recompte ha demostrat que es manté una gran diversitat i riquesa d'espècies, en comparació amb anys enrere. Els promotors del cens en destaquen l'augment del nombre d'ànecs collverds, de cigonyes i d'altres espècies d'ànecs salvatges. Pel que fa a les cigonyes, a diferència d'ara fa un any, sí que n'han vist, en concret –han explicat– “la parella reproductora que cria a la zona de la Puda, que ja està habitualment al niu, i a més quatre exemplars més que dormen a la ciutat de Banyoles i visiten sovint l'abocador de Puigpalter”. Així mateix, s'ha confirmat la presència d'espècies no gaire abundants, com per exemple el blauet, el cabusset, els becadells i els bernats pescaires. També una àliga calçada, que és un rapinyaire protegit.

Quant a l'espècie més singular detectada, ha estat el morell de plomall, del qual no es tenia constància a l'estany des del 1997. Per contra, s'ha reduït molt la presència del morell de cap roig, similar a un ànec capbussador que freqüenta la zona dels desmais, al sud del llac.

Publicat a:

-El Punt Avui. Comarques Gironines 16-01-2013 Pàgina 12

Font del document:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient/610797-augmenta-el-nombre-daus-que-deixen-abandonades-a-lestany-de-banyoles.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mes&utm_source=rss&utm_medium=mes&utm_campaign=rss