

fuertes ó arcillosas que se araron en invierno ó antes dejando el surco abierto para mejor utilizar la accion benéfica de los hielos.

Fuera muy ventajoso pasar un *rodillo* ó cilindro liso de madera ó de piedra sobre los trigos para apretar las raíces en el suelo, las que en ciertos años se hallan cuasi desgarradas y en suspension entre la tierra levantada y mullida por los fuertes hielos. No siendo posible pasar el *rodillo*, por ser apero desconocido de nuestros labradores, podria en parte suplirse *aplanando* los trigos con la rastra puntas arriba, ó de otro modo que produjese un efecto análogo.

En marzo los labradores debieran ocuparse muy particularmente en preparar toda clase de terreno que se halle sin sembrar y destinado para estivales ó á quedar de barbecho hasta el próximo otoño. Esta preparacion de todas las dichas tierras, consiste en ponerla de modo que se facilite la germinacion de las semillas de plantas extrañas y malas yerbas que se encuentren en la tierra. Unos terrenos necesitan la rastra, otros el arado, y los hay que para ponerlos en buen estado hacen indispensable la azada ó azadon.

Ahora tambien es la época á propósito para estercolar todos los terrenos, porque facilmente nacen las granas que pueden contener, y es mas fácil destruirlas despues con una vuelta de arado. Asi mismo y por la misma razon, en este mes debieran quedar levantados todos los rastros del año anterior que no lo estuvieren ya.

En marzo se pueden hacer las siembras tardías de gramíneas y de algunas leguminosas; asi mismo comenzar las de prados tanto naturales como artificiales, hacer los semilleros de remolachas, y plantar patatas y otros tubérculos.

Pasado marzo el entrar en los sembrados para arrancar las malas yerbas, los puede perjudicar mucho por hallarse demasiado adelantados.

*Ganadería.* Esta es la época mas difícil para toda suerte de ganado, cuando no ha habido prevision por parte de los pastores y ganaderos, por ser la de mayor escasez de alimento. Este mal, que es tan general, en años comunes con facilidad se remedia por medio de los *rábanos*, *nabos*, *centeno* sembrados en agosto ó setiembre, *pimpinela*, *esparceta* y tambien con la *alfalfa* y el *trébol rojo* en algunos años.

Los *rábanos* que ya en algunos años pueden servir de alimento desde diciembre y que siempre adelantan á los *nabos*, siendo buen recurso para enero y febrero, debieran tenerlos presente los ganaderos, y sembrarlos solos, ó con *trébol rojo* (*fench*), ó *centeno*, ó todo junto por agosto, y en ciertos años hasta podrian sembrarse desde julio: no debe perderse medio de procurar alimento á los ga-