En este mes continua la monta de las yeguas. Las sanas y vigorosas pueden entregarse á ella despues de doce ó quince dias de haber parido. En cuanto á las vacas y ovejas, en este pais no se sigue ninguna regla, se las abandona á la naturaleza, y la monta se hace con bastante irregularidad. En los paises donde hay cuidado en eso, pasado mayo raras veces se cubren las vacas, y esto tan solo despues de dos meses del parto.

La lana en este tiempo ha adquirido ya todo su aumento, y por esto se hace el esquileo de las ovejas y carneros, á veces se adelanta y comienza á fines de abril.

En los dias buenos de mayo en que comienza á sentirse el calor, debe cuidarse de que el ganado lanar no lo experimente, y á este fin se retiran temprano por la mañana y no salen hasta declinar la tarde. Este ganado teme mucho el calor; su salud peligra, y ademas la lana pierde de su finura.

Pasado este mes ya no es bueno castrar ninguna res, y si las hay que se hallen en disposicion de esto, vale mas aguardar el otoño.

Los lechones (*porchs*) se pueden castrar desde la edad de 8 dias hasta un año; pero es mejor no practicarlo hasta que tengan dos meses. A los berracos, cuando tienen mas de dos años, se les hace muy peligrosa esta operacion; y respecto á las hembras es bueno que hayan parido dos ó tres veces, porque la castracion de pequeñas, á mas de ser dificultosa no las deja crecer tanto.

Aves de corral. No obstante que los *polluelos* nacidos en este mes, no necesitan tanto cuidado como en los meses anteriores; segun los años, pasan dias en que deben todavía resguardarse del frio y mas de la humedad. La *gallina* clueca de mayo aun puede hacer la incubacion de sus propios huevos, de otras gallinas ó de ánades con ventaja; pudiendo empollar mas huevos que en abril y marzo.

Los ánades (*ánachs*) pequeñuelos cuando emplumecen, á mas de patatas cocidas, pan remojado ó sopa, y otras cosas molidas ó picadas y húmedas, es bueno que coman avena (*civada*); en este caso ya pueden ir al agua sin riesgo.

Los pavillos (*indicts petits*) que salen del cascarron (*escloba*) deben dejarse debajo la madre, hasta que hayan perdido la natural humedad del nacer. En seguida pueden ponerse en una cesta ú otra cosa que tenga abrigo de plumas ó lana, y colocarse en un puesto caliente. Al principio se les da de comer un migajon (*mullada*) de pan desmenuzado entre las manos; cinco ó seis dias despues se les da algo cocido, y en lo sucesivo comen de todo. A los ocho dias pueden ya sacarse al sol, y ultimamente teniendo doce ó quince dias salen con la madre.