

COSECHA DE LAS SETAS

Se hace sin descubrir más sitio que el que sea necesario para sacar las setas que estén criadas, cubriendo estos mismos sitios con nueva tierra tamizada. Cada montón puede producir setas durante al menos cuatro meses.

A esto que acabamos de exponer se reduce el cultivo y cosecha de las setas que en tan grande escala se hace en las inmediaciones de París y en otros muchos puntos de Francia. Esto que se está haciendo en Francia dando excelentes resultados pecuniarios, sensible y lamentable es para nuestra horticultura que en España sea muy raro el jardinero ó el hortelano que se dedique al cultivo del hongo comestible.

SÍNTOMAS DEL ENVENENAMIENTO

DE LAS SETAS Ú HONGOS

Consisten en náuseas, desfallecimiento y vómitos que se presentan 6 ú 8 horas después de ingeridos los hongos en el estómago, que no siendo arrojados por la ayuda de un emético se manifiesta estupor; señalencia el pulso disminuye y es intermitente, el vientre se tiende, enfríanse las extremidades, la piel se pone lívida, y si no se ayuda al paciente con una medicación apropiada, llega la muerte al cabo de tres días. Los médicos aconsejan como antidatos hacer vomitar con abundancia al enfermo sin pérdida de tiempo, que se facilita bebiendo mucha agua templada, y enseguida se dan medicamentos emolientes y á veces purgantes, habiéndose desechado el vinagre que aumenta los accidentes por disolver el principio venenoso.
